

Práctico 2: Esfera Celeste

1. Un bólido en movimiento rectilíneo aparece en el cielo en un punto de azimut $A = 90^\circ$ y altura $h = 40^\circ$ y luego desaparece en el horizonte en un punto de azimut $A = 220^\circ$ (sentido NOSE). Hallar la máxima altura en grados que alcanza la trayectoria observada.

Respuesta: $h_{max} = 47,6^\circ$

2. Si ψ es el menor de los dos ángulos que forma el horizonte con el paralelo celeste de una estrella de declinación δ , pruebe que a la salida o a la puesta de la estrella se cumple que:

$$\cos \psi = \sin \phi \sec \delta$$

3. Si la declinación δ de una estrella es del mismo signo que la latitud ϕ pero de mayor valor absoluto, pruebe que el mayor azimut al Este ó al Oeste cumple: $\sin A = \cos \delta \sec \phi$
4. Las coordenadas ecuatoriales absolutas de la estrella Capella son $\alpha = 5^h 11^m$ y $\delta = 45^\circ 55'$. En el momento de culminar superiormente en Greenwich encontrar la altura y el azimut de la estrella en el Observatorio de la Universidad de Columbia en New York en latitud $\phi = +40^\circ 49'$ y longitud $\lambda = 4^h 56^m W$.

Respuesta: $h_{NY} = 37^\circ 56'$, $A_{NY} = -57^\circ 59'$

5. Si la latitud ϕ de un lugar y la declinación δ de una estrella son conocidas, demuestre que el error en el valor deducido del ángulo horario H debido a un error Δz en la medida de la distancia cenital z viene dado por:

$$\Delta H = \Delta z \csc A \sec \phi$$

donde A es el azimut de la estrella.

6. Probar que la distancia cenital del polo norte de la eclíptica está dada por:

$$z = \arccos(\cos \epsilon \sin \phi - \sin \epsilon \cos \phi \sin TS)$$

donde TS el tiempo sidéreo local, ϵ es la oblicuidad de la eclíptica y ϕ la latitud geográfica del observador.

7. Un gnomon vertical se utiliza como reloj de Sol en un lugar de latitud geográfica $\phi = -35^\circ$. Hallar el ángulo que forman entre sí las sombras del gnomon correspondientes a los ángulos horarios del Sol $H_1 = -2^h$ y $H_2 = 4^h$ en el día del solsticio de verano cuando la declinación del Sol es $\delta_\odot = -23,45^\circ$.

Respuesta: $159,7^\circ$

8. Considere 12 objetos astronómicos ubicados a una misma declinación $\delta = -21,36^\circ$ y distribuidos uniformemente en ascensión recta desde $\alpha = 0^h$ hasta $\alpha = 11^h$. Se les desea observar desde un observatorio ubicado en latitud geográfica $\phi = -35^\circ$ con la condición de que su masa de aire sea $\chi < 1,15$. Suponga que la duración de la observación de cada objeto es de unos pocos segundos y es por lo tanto despreciable frente a la duración de la noche. Si la observación está planificada para una fecha en la que el crepúsculo astronómico comienza a las 19:00:00 de hora local cuando el tiempo sidéreo local es 06:30:00 y que el amanecer astronómico finaliza a las 07:00:00 de hora local:

- (a) Dibuje la bóveda celeste con la posición de los objetos al momento del crepúsculo astronómico.
- (b) ¿A cuáles objetos se podrá observar durante la noche bajo esa condición de χ ?
- (c) ¿En qué orden los observaría?



- (d) ¿A qué hora observaría el primero de los objetos observables?
- (e) ¿A qué hora observaría a los restantes objetos observables?
- (f) ¿Cómo cambiarían sus respuestas anteriores si la duración de la observación de cada objeto fuera de 90 minutos?