

PRÁCTICO 8

1. Sean  $a_0, a_1, a_2 \in C[a, b]$ , y supongamos que para cada  $y \in C[a, b]$  y cada par  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  el siguiente problema de valores iniciales tiene una única solución  $u_{y,\alpha,\beta} \in C^2[a, b]$ :

$$\begin{cases} a_0 x'' + a_1 x' + a_2 x = y \\ x(a) = \alpha, x'(a) = \beta \end{cases}$$

Mostrar que  $u_{y,\alpha,\beta}$  y sus dos primeras derivadas dependen de manera continua de  $y$ ,  $\alpha$ , y  $\beta$ ; más precisamente, demostrar que para cualquier  $\epsilon > 0$  existe  $\delta > 0$  tal que si  $\max\{\|y_1 - y_2\|_\infty, |\alpha_1 - \alpha_2|, |\beta_1 - \beta_2|\} < \delta$ , entonces  $\max\{\|u_1 - u_2\|_\infty, \|u_1' - u_2'\|_\infty, \|u_1'' - u_2''\|_\infty\} < \epsilon$ , donde  $u_1 = u_{y_1,\alpha_1,\beta_1}$  y  $u_2 = u_{y_2,\alpha_2,\beta_2}$ .

2. Sean  $X$  e  $Y$  espacios de Banach y  $T \in B(X, Y)$ . Mostrar que existe  $\alpha > 0$  tal que  $\|Tx\| \geq \alpha\|x\| \forall x \in X$  sii  $\ker T = 0$  y  $T(X)$  es cerrado.
3. Mostrar que si  $E : X \rightarrow X$  es una transformación lineal en el espacio de Banach  $X$ , tal que  $E^2 = E$  y que ambos,  $\ker E$  y  $\text{ran } E$  son cerrados, entonces  $E$  es acotado.
4. Sea  $p \in [1, \infty]$ , y supongamos que  $(a_{ij})$  es una matriz tal que  $Tx(i) := \sum_{j=1}^\infty a_{ij}x(j)$  define un elemento  $Tx \in \ell^p$  para todo  $x \in \ell^p$ . Probar que  $T \in B(\ell^p)$ .
5. Sean  $p, q \in (1, \infty)$  con  $1 = 1/p + 1/q$  y  $(x_n) \subseteq \ell^p$ . Entonces  $\lim_n \sum_{j=1}^\infty x_n(j)y(j) = 0$  para todo  $y \in \ell^q$  sii  $\sup_n \|x_n\|_p < \infty$  y  $x_n(j) \rightarrow 0$  para todo  $j \geq 1$ .
6. Sean  $X$  e  $Y$  espacios de Banach, y  $T : X \rightarrow Y$  lineal. Probar que son equivalentes:  
 a)  $T$  es acotado.      b)  $\varphi \circ T \in X^*, \forall \varphi \in Y^*$ .      c)  $T : (X, w) \rightarrow (Y, w)$  es continua.
7. Considérese el espacio de Banach complejo  $X := \{x \in C[0, 2\pi] : x(0) = x(2\pi)\}$  con la norma  $\|\cdot\|_\infty$ . Para cada  $n$  sea  $S_n \in B(X)$  el operador que asigna a  $x$  su  $n$ -ésima suma de Fourier  $S_n x$ , es decir:

$$S_n x(t) = \sum_{k=-n}^{k=n} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(s) e_{-k}(s) ds e_k(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(s) D_n(t-s) ds,$$

donde  $e_k(t) = \exp(ikt)$  y  $D_n$  es el núcleo de Dirichlet ( $D_n(t) = \sum_{k=-n}^{k=n} e_k(t) = \frac{\text{sen}(n+\frac{1}{2})t}{\text{sen}\frac{1}{2}t}$ ). Mostrar que  $\|S_n\| = \|D_n\|_1 \rightarrow \infty$ , y deducir que existen funciones  $x \in X$  cuya serie de Fourier no es uniformemente convergente. Más aún, componiendo  $S_n$  con la evaluación en  $t = 0$ , deducir que existe  $x \in X$  cuya serie de Fourier diverge en  $t = 0$ .

8. Sean  $X := L^1[0, 2\pi]$ ,  $x \in X$ , y para cada  $n \in \mathbb{Z}$  sea  $\hat{x}(n)$  el  $n$ -ésimo coeficiente de Fourier de  $x$ , es decir:  $\hat{x}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(t) e^{-int} dt$ . Por el lema de Riemann–Lebesgue sabemos que  $(\hat{x}(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in c_0(\mathbb{Z})$ . Por lo tanto tenemos un operador  $T : X \rightarrow c_0(\mathbb{Z})$  dado por  $T(x) = (\hat{x}(n))_{n \in \mathbb{Z}}$ . Es bien conocido que  $T$  es inyectivo. Probar que  $T$  es acotado y que no es sobreyectivo (sugerencia: usar el núcleo de Dirichlet - ver el Ejercicio 7 - para probar que no existe  $\epsilon > 0$  tal que  $\|TD_n\|_\infty \geq \epsilon \|D_n\|_1, \forall n$ ).

9. Sea  $(e_n)$  una sucesión en un espacio de Banach  $X$ , tal que para todo  $x \in X$  existen únicos escalares  $(\alpha_n)$  tales que  $x = \sum_n \alpha_n e_n$ . Una tal sucesión se llama base de Schauder para  $X$ .
- Mostrar que  $c_0$  tiene una base de Schauder, y averiguar si lo mismo ocurre con  $\ell^p$ ,  $1 \leq p \leq \infty$ .
  - Probar que si  $X$  tiene una base de Schauder, entonces es separable y tiene una base formada por vectores de norma igual a 1.
  - Supongamos que  $(e_k)_{k \geq 1}$  es una base de Schauder de  $X$ , con  $\|e_k\| = 1, \forall k \geq 1$ .
  - Sea  $Y := \{(\alpha_k) \subseteq \mathbb{F} : \sum_k \alpha_k e_k \text{ converge en } X\}$ . Probar que  $Y$  es un espacio de Banach con la norma  $\|(\alpha_k)\| := \sup_n \|\sum_1^n \alpha_k e_k\|$ .
  - Mostrar que  $X$  e  $Y$  son espacios de Banach isomorfos.
  - Sea  $\varphi_n : X \rightarrow \mathbb{F}$  dada por  $\varphi(\sum_k \alpha_k e_k) = \alpha_n$ . Probar que  $\varphi_n \in X^*$ .
  - Mostrar que  $e_n \notin \overline{\text{span}}\{e_k\}_{k \neq n}$ .