

Práctico 6: Técnicas de integración

1. Calcular las siguientes integrales indefinidas utilizando integración por partes

- a) $\int \theta \cos \theta d\theta$, d) $\int x^2 e^x dx$, g) $\int x \ln x dx$,
b) $\int \cos^2 \theta d\theta$, e) $\int z^3 e^z dz$, h) $\int (\ln x)^2 dx$,
c) $\int x e^x dx$, f) $\int \ln x dx$, i) $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$

2. Calcular las siguientes integrales indefinidas utilizando integración por sustitución.

- a) $\int \cos^3 \theta \sin \theta d\theta$, d) $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$, g) $\int x \ln x dx$,
b) $\int \tan \theta d\theta$, e) $\int \frac{2+x}{4x+x^2} dz$, h) $\int x \sqrt{1-x^2} du$,
c) $\int \frac{x}{e^{x^2+1}} dx$, f) $\int e^{\sin x} \cos x dx$, i) $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

3. Calcule las siguientes integrales definidas:

- a) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \theta \cos \theta d\theta$, d) $\int_0^1 x^2 e^x dx$, h) $\int_{-1}^1 x \sqrt{1-x^2} du$,
b) $\int_1^e (\ln x)^2 dx$ f) $\int_0^{\pi/2} e^{\sin x} \cos x dx$,
c) $\int_{-1}^1 x e^x dx$, g) $\int_1^2 x \ln x dx$, i) $\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

4. Consideremos la función $\sec \theta := 1/\cos \theta$.

- a) Probar que $(\sec \theta)' = \sec \theta \tan \theta$.
b) Probar la igualdad

$$\sec \theta = \frac{\sec^2 \theta + \sec \theta \tan \theta}{\sec \theta + \tan \theta}$$

(sugerencia: $1 = \frac{\sec \theta + \tan \theta}{\sec \theta + \tan \theta}$)

- c) Calcular la integral indefinida $\int \sec \theta d\theta$ (sugerencia: sustitución $u = \sec \theta + \tan \theta$).
d) Verifique que el resultado de la parte c) proporciona efectivamente las primitivas de $\sec \theta$ (el resultado correcto para esa parte es $\ln |\sec \theta + \tan \theta| + C$).

5. Calcule las siguientes integrales utilizando una sustitución trigonométrica adecuada (ver lista de más abajo)

a) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1-x^2} dx$

d) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+16}}$,

b) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{4-x^2}}$

f) $\int \sqrt{1-4x^2} dx$,

c) $\int_0^{2\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx$,

g) $\int_3^6 \frac{\sqrt{x^2-9}}{x^3} dx$.

Expresión	Sustitución	Identidad
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \operatorname{cos}^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$	$1 + \tan^2 \theta = \operatorname{sec}^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \operatorname{sec} \theta, \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2} \text{ o } \pi \leq \theta < \frac{3\pi}{2}$	$\operatorname{sec}^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

6. Calcular las integrales en a) y c) del ejercicio anterior utilizando una sustitución de la forma $u = a^2 \pm x^2$ (observe también las integrales d) y h) del ejercicio 2).

Ejercicios opcionales

7. Considere t como función de x haciendo $t = \tan(x/2)$, donde $-\pi < x < \pi$.

a) Demostrar las identidades

$$\operatorname{cos}(x/2) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \operatorname{sen}(x/2) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

(sugerencia: represente $x/2$ como un ángulo en el círculo trigonométrico y sírvase de fórmulas trigonométricas conocidas)

b) Deduzca las identidades

$$\operatorname{cos} x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \operatorname{sen} x = \frac{2t}{1+t^2}$$

c) Utilizando que si $t = f(x)$, entonces $x = f^{-1}(t)$ es la correspondiente función inversa de t , demuestre que

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt.$$

8. Como aplicación del ejercicio anterior calcule las integrales

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \operatorname{sen} x - \operatorname{cos} x}, \quad \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2 + \operatorname{cos} x} dx.$$