









20- ONDAS SONORAS



Repaso de lo visto anteriormente

ONDAS ESTACIONARIAS EN CUERDA FIJA EN AMBOS EXTREMOS



Modos de oscilación normales:

1er. modo normal: 2 nodos en extremos y 1 antinodo en medio (1 bucle): $\lambda_1 = 2L$.

2do. modo normal: cuerda vibra en dos bucles. $\lambda_2 = L$.

3er. modo normal $\lambda_3 = 2L/3$; cuerda vibra en 3 bucles.

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

Frecuencias naturales (f_n) asociadas con los modos de oscilación ($f = v/\lambda$) donde la rapidez de onda v es la misma para todas las frecuencias.

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2L} = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Frecuencia
fundamental

Frecuencias modos restantes: son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental:

$$f_n = n \cdot f_1$$

$$f_1 = \frac{v}{2L}$$


$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

Forman una **serie armónica**, los modos normales se llaman armónicos.

Repaso de lo visto anteriormente

ONDAS ESTACIONARIAS EN COLUMNAS DE AIRE

Tubo abierto en ambos extremos: ambos extremos son antinodos de desplazamiento



$$f_1 = \frac{v}{2L} \quad f_n = nf_1 = n \frac{v}{2L} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$


$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad f_n = n \frac{v}{2L}$$

Las frecuencias naturales de oscilación forman una serie armónica que incluye todos los múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

Idéntico a las frecuencias de una cuerda con extremos fijos, pero v en esta ecuación es la rapidez del sonido en el aire.

Repaso de lo visto anteriormente

Tubo con un extremo abierto y otro cerrado: Nodo de desplazamiento en extremo cerrado y antinodo en el abierto.




$$\lambda_1 = 4L$$
$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4L}$$

Primer armónico



$$\lambda_3 = \frac{4}{3}L$$
$$f_3 = \frac{3v}{4L} = 3f_1$$

Tercer armónico



$$\lambda_5 = \frac{4}{5}L$$
$$f_5 = \frac{5v}{4L} = 5f_1$$

Quinto armónico

$$\lambda_1 = 4L ; \lambda_2 = \frac{4L}{3} ; \lambda_3 = \frac{4L}{5} \dots \lambda_n = \frac{4L}{2n-1} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{v}{4L} ; f_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{3v}{4L} ; f_3 = \frac{5v}{4L} \dots f_n = \frac{(2n-1)v}{4L} \quad n = 1, 2, 3 \dots$$


$$f_{2n-1} = (2n-1) \frac{v}{4L} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Los armónicos superiores tienen frecuencias $3f_1, 5f_1, \dots$

Tubo cerrado en un extremo, frecuencias naturales forman una serie armónica que incluye sólo múltiplos enteros impares de la frecuencia fundamental.

EJEMPLO- Ejercicio 4.2.2

Un instrumento musical consiste de un tubo cerrado en los dos extremos, con una apertura en la pared lateral, y una cuerda estirada fuera y paralela al tubo tal que pasa sobre la apertura. La cuerda y el tubo tienen la misma longitud de 50 cm. Al tocar la cuerda, los primeros 5 armónicos son excitados apreciablemente. Los armónicos de la cuerda dan lugar a un sonido fuerte solo si su frecuencia es cercana a una frecuencia resonante del tubo. La tensión en la cuerda es 588 N y su masa es 10 g.



a) ¿Cuáles son las frecuencias de los armónicos que están amplificados de esta manera?

b) ¿Cuáles serían las frecuencias si uno de los extremos del tubo se abre?

La cuerda tiene sus dos extremos fijos, por lo que aparecerán ondas estacionarias cuyas frecuencias (armónicas) están dadas por:

$$f_n = nf_1 = n \frac{v}{2L} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Debo conocer la velocidad con que se propagan las ondas en la cuerda:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Para la cuerda: $L = 0,50 \text{ m}$ $m = 10 \text{ g} = 0,010 \text{ kg}$ $T = 588 \text{ N}$

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,010 \text{ kg}}{0,50 \text{ m}} = 0,020 \text{ kg/m}$$

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{588}{0,020}} = 171 \text{ m/s} \quad (171,46 \text{ m/s})$$

$$f_n = n \frac{v}{2L} = n \frac{171}{2(0,50)}$$


$$f_1 = 1,7 \times 10^2 \text{ Hz}; f_2 = 3,4 \times 10^2 \text{ Hz}; f_3 = 5,1 \times 10^2 \text{ Hz}$$

$$f_4 = 6,9 \times 10^2 \text{ Hz}; f_5 = 8,6 \times 10^2 \text{ Hz};$$

EJEMPLO- Ejercicio 4.2.2

Un instrumento musical consiste de un tubo cerrado en los dos extremos, con una apertura en la pared lateral, y una cuerda estirada fuera y paralela al tubo tal que pasa sobre la apertura. La cuerda y el tubo tienen la misma longitud de 50 cm. Al tocar la cuerda, los primeros 5 armónicos son excitados apreciablemente. Los armónicos de la cuerda dan lugar a un sonido fuerte solo si su frecuencia es cercana a una frecuencia resonante del tubo. La tensión en la cuerda es 588 N y su masa es 10 g.

- a) ¿Cuáles son las frecuencias de los armónicos que están amplificados de esta manera?
- b) ¿Cuáles serían las frecuencias si uno de los extremos del tubo se abre?



Los modos normales para un tubo con ambos extremos cerrados, son iguales a los correspondientes a uno con ambos extremos abiertos, ya que tiene un nodo en c/u de los extremos, por lo que la longitud de onda del primer modo vale: $\lambda_1 = 2L$ (igual que cuando ambos extremos están cerrados).

Considero que la velocidad del sonido en el aire vale $v_s = 343$ m/s.

$$f_n = n \frac{v_s}{2L}$$

$$f_n = n \frac{v_s}{2L} = n \frac{343}{2(0,50)}$$

Los primeros armónicos son:


$$f_1 = 3,4 \times 10^2 \text{ Hz}; f_2 = 6,9 \times 10^2 \text{ Hz}; f_3 = 1,0 \times 10^3 \text{ Hz}$$

Se amplificarían los siguientes armónicos: $3,4 \times 10^2$ Hz, $6,9 \times 10^2$ Hz

EJEMPLO- Ejercicio 4.2.2

Un instrumento musical consiste de un tubo cerrado en los dos extremos, con una apertura en la pared lateral, y una cuerda estirada fuera y paralela al tubo tal que pasa sobre la apertura. La cuerda y el tubo tienen la misma longitud de 50 cm. Al tocar la cuerda, los primeros 5 armónicos son excitados apreciablemente. Los armónicos de la cuerda dan lugar a un sonido fuerte solo si su frecuencia es cercana a una frecuencia resonante del tubo. La tensión en la cuerda es 588 N y su masa es 10 g.

- a) ¿Cuáles son las frecuencias de los armónicos que están amplificados de esta manera?
- b) ¿Cuáles serían las frecuencias si uno de los extremos del tubo se abre?



Si ahora el tubo tiene uno de los extremos abierto, las frecuencias de los modos normales están dados por:

$$f_{2n-1} = (2n - 1) \frac{v}{4L} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$f_{2n-1} = (2n - 1) \frac{v_s}{4L} = (2n - 1) \frac{343}{4(0,50)} =$$

Los primeros armónicos son:

$$f_1 = 1,7 \times 10^2 \text{ Hz}; f_3 = 5,1 \times 10^2 \text{ Hz}; f_5 = 8,6 \times 10^2 \text{ Hz} \dots$$

Se amplificarían los siguientes armónicos: $1,7 \times 10^2 \text{ Hz}$, $5,1 \times 10^2 \text{ Hz}$ y $8,6 \times 10^2 \text{ Hz}$

EFFECTO DOPPLER

Si un vehículo se mueve mientras hace sonar su bocina, la frecuencia del sonido que se oye es más alta (más agudo) cuando el vehículo se acerca y más baja cuando se aleja (más grave).

Este fenómeno es un ejemplo del **efecto Doppler**.

Se oye el mismo efecto si el oyente se mueve y la bocina está fija: la frecuencia es más alta cuando nos acercamos a la fuente y más baja cuando nos alejamos.

Aunque el efecto Doppler se asocia más a menudo con el sonido, es común a todas las ondas, incluyendo las de luz (corrimiento hacia el rojo de galaxias que se alejan).

Por ejemplo, el movimiento relativo de la fuente y el observador produce un corrimiento de frecuencia en las ondas luminosas.

El efecto Doppler se usa por ejemplo en los sistemas de radar policíacos para medir la rapidez de los vehículos o los astrónomos para determinar la rapidez de estrellas, galaxias y otros objetos celestes en relación con la Tierra.

Nos restringiremos al efecto Doppler aplicado al sonido y supondremos que el aire está inmóvil y que todas las medidas de la velocidad están hechas en relación con este medio inmóvil.

La velocidad v_o corresponde al observador, v_s es la velocidad de la fuente y v es la velocidad del sonido.


Efecto Doppler - Apps. de Física Walter Fendt:

https://www.walter-fendt.de/html5/phes/dopplereffect_es.htm



EFEECTO DOPPLER

Observador se mueve hacia la fuente



Un observador O (el ciclista) se mueve con una rapidez v_0 hacia una fuente puntual estable S , la bocina de una camioneta estacionada. El observador escucha una frecuencia f' mayor que la frecuencia de la fuente.

La longitud de onda no cambia.
Se percibe una frecuencia mayor.

Rapidez relativa de las ondas respecto al observador: $v' = v + v_0$

La longitud de onda no cambia, entonces detecta una frecuencia f' :

$$f' = \frac{v'}{\lambda} = \frac{v + v_0}{\lambda} = \frac{v + v_0}{\frac{v}{f}} = \frac{v + v_0}{v} f$$

$$f' = \frac{v + v_0}{v} f$$

Si en cambio el observador se aleja de la fuente:

$$f' = \frac{v - v_0}{v} f$$

EFEECTO DOPPLER

Fuente en movimiento (velocidad v_s) y observadores en reposo

Para el observador A los frentes de onda están más juntos y se acorta la longitud de onda en un valor $\Delta\lambda = v_s \cdot T$

$$\lambda' = \lambda - \Delta\lambda = \lambda - v_s T = \lambda - \frac{v_s}{f}$$

Frecuencia percibida por A

$$f' = \frac{v}{\lambda'} = \frac{v}{\lambda - \frac{v_s}{f}} = \frac{v}{\frac{v}{f} - \frac{v_s}{f}} = \frac{v}{v - v_s} f$$

$$f' = \frac{v}{v - v_s} f$$



(fuente acercándose)

Si la fuente se aleja del observador estacionario (B) que mide una λ' mayor que λ y escucha una frecuencia:

$$f' = \frac{v}{v + v_s} f$$

EFEECTO DOPPLER

Fuente en movimiento (velocidad v_s) y observadores en reposo



- a) Una fuente S se mueve con una rapidez v_s hacia un observador estable A y se aleja de un observador estable B. El observador A escucha una frecuencia mayor y el observador B una frecuencia reducida.
- b) El efecto Doppler en el agua, observado en un tanque de ondas. Una fuente puntual que se mueve con rapidez v_s .

EFEECTO DOPPLER

Se pueden combinar los dos casos, para usar una única ecuación:

$$f' = \frac{v + v_o}{v - v_s} f$$

En esta expresión se deben usar los signos de las velocidades de la siguiente forma:

v_o es positiva si el observador se acerca a la fuente, si se aleja es negativa

v_s es positiva si la fuente se acerca al observador, si se aleja es negativa

El valor positivo se usa para el movimiento del observador o de la fuente hacia el otro acercándose, asociada con el aumento de la frecuencia percibida.

El valor negativo se usa para el movimiento de uno alejándose del otro, asociada con una disminución de la frecuencia percibida.

EJEMPLO- Ejercicio 4.2.9

Un auto de policía que suena una sirena con una frecuencia de 1200 Hz viaja a 126 km/h . Otro automóvil viaja en sentido contrario a una velocidad de 72,0 km/h. Considere que la velocidad del sonido en el aire vale 343 m/s. ¿Cuánto vale, en Hz, la diferencia entre la frecuencia que percibe el conductor del auto antes y después de que lo pase el auto de policía?

$$v = 343 \text{ m/s} \quad f = 1.200 \text{ Hz} \quad v_s = 126 \text{ km/h} = 35,0 \text{ m/s} \quad v_o = 72,0 \text{ km/h} = 20,0 \text{ m/s}$$

Antes de cruzarse, se están aproximando por lo que la frecuencia que percibe el conductor del auto f_A estará dada por:

$$f_A = \frac{v + v_o}{v - v_s} f = \frac{343 + 20,0}{343 - 35,0} (1.200 \text{ Hz}) = 1.414,29 \text{ Hz}$$

Después de cruzarse, el conductor del auto percibe una frecuencia f_D que estará dada por:

$$f_D = \frac{v - v_o}{v + v_s} f = \frac{343 - 20,0}{343 + 35,0} (1.200 \text{ Hz}) = 1.025,40 \text{ Hz}$$

$$\Delta f = f_A - f_D = 1414,29 - 1025,40 = 388,89 \text{ Hz}$$

$$\Delta f = 389 \text{ Hz}$$

