Oceanografía Físico-Química (2021)

Clase: Introducción a la Oceanografía Geológica

Leticia Burone: lburone@fcien.edu.uy

- **Origen y morfología de las cuencas oceánicas:**

- *Tectónica de placas y accidentes geográficos y sedimentológicos*

- *Apertura del Océano Atlántico*

- *El marco geológico de los océanos*

Un planeta cubierto en su mayor parte por OCEANOS

Un planeta con elevada:
Biodiversidad
Geodiversidad
Hidrodiversidad

El Ambiente Marino

- Océanos - 71% superficie terrestre e prof. media de 4.000 m.
- 98 % del agua se encuentra en los océanos

Cómo se formaron los océanos?

Cómo todo empezó?

4,5 billones de años atrás la Tierra era una mezcla de gases hidrógeno, helio y polvo cósmico. Todo eso era una bola caliente de material derretido que generaba nubes gaseosas (vapor de agua, CO_2 , Cl_2 , N_2 y H_2). La temperatura fue bajando y, cerca de 3,9 billones de años, la parte externa se endureció formando las ROCAS y la cobertura externa de la Tierra (CORTEZA). Al mismo tiempo el vapor de agua se condensó y formó finas nubes que originaron los primeros océanos que llenaron la superficie de la Tierra. Por la gravedad el agua se ubicó en las áreas más bajas de la Tierra.

Estructura interior de la Tierra

- Su conocimiento avanzó con la sismología.

- Cada capa representa una región con una densidad diferente.

- Corteza terrestre: capa más externa (35 km).

- Corteza y capa superior manto (70 km) son frías.

- Corteza terrestre: A) Corteza Continental y B) Corteza Oceánica.

- La temperatura incrementa con Z en la corteza a una tasa de 30 °C por km.

- El centro de la Tierra tiene una temp. entre 2000 y 6500 °C.

FIG. 26.—La corteza de la Tierra. M-M, discontinuidad de Mohorovičić.

La base de la corteza terrestre está marcada por un límite:

(zona de transición donde ondas sísmicas cambian su veloc.).

DISCONTINUIDAD DE MOHOROVICIC

(Andrija Mohorovicic, 1909)

En base de C. continental MOHO descansa a prof. de 40 km,
 en base de C. oceánica MOHO descansa a 5 km.

Corteza Continental (más heterogénea, menor densidad):

Rocas graníticas baja densidad y de color claro

Denominadas SIAL debido a los altos contenidos de Si y Al.

Corteza Oceánica (3 niveles: Gabro, Basalto y Sedimentos pelágicos y terrestres)

Rocas tipo basálticas de alta densidad y de colores oscuras

Llamadas SIMA debido a los elevados contenidos de Si y Mg.

El manto está compuesto por rocas más densas que la corteza por eso la corteza tiende a flotar sobre el manto.

Roca basáltica

Roca granítica

La mayor parte de la corteza oceánica se encuentra debajo del mar.
Hay excepciones:
Islandia y República Djibouti

- ORIGEN DE LOS OCEANOS

Deriva Continental (Alfred Wegner 1912)

Meteorólogo y geofísico alemán)

Wegener sugirió que en el pasado (200 Ma) existió un supercontinente PANGEA rodeado de un océano PANTHALASA

Deriva Continental (Alfred Wegner 1912)

Es el desplazamiento de las masas continentales unas respecto a las otras

“Entstehung der kontinente und Ozeane”
(La formación de los Continentes y Océanos) 1915

Observaciones empíricas:

-Manera en que parecen encajar los continentes a cada lado del océano (Am. del Sur y África);

-El parecido de fauna fósil de los continentes y ciertas formaciones geológicas;

- Los climas antiguos.

-Conjeturó que el conjunto de los continentes estuvieron unidos en el pasado remoto de la Tierra formando un super continente: PANGEA “Toda la Tierra”.

Tipos de rocas y semejanzas estructurales

• Wegener encontró rocas ígneas de hace unos 2,200 millones de años en Brasil y del mismo tipo en África

Semejanza en las Cadenas montañosas como las Apaches ubicadas en Norteamérica con rocas del mismo tipo en las montañas Caledónicas en Escandinavia

Glaciación Gondwana

Evento glacial pérmico hace (280 millones de años)

Sudamérica, África, India, Australia y Antártida

Huellas en el registro geológico (depósitos de material acarreado por el hielo y marcas de abrasión).

Este planteamiento fue descartado por la mayoría de sus colegas (especialmente geólogos y geofísicos) ya que carecía de un mecanismo para explicar la deriva de los continentes.

Paleomagnetismo y deriva continental (1950)

Rocas con minerales ricos en Fe, como la magnetita son comunes en la composición de la lava basáltica y actúan como (brújula fósil)

Cuando la roca se calienta por encima del punto de Curie (585) pierden el magnetismo pero cuando se enfrían se magnetizan en dirección paralela a las líneas de fuerza magnética existentes en ese momento.

Expansión del fondo oceánico

Tectónicas de Placas y el Origen de las Cuencas Oceánicas (1968)

Placas tectónicas o placas litosféricas: son bloques gigantes que componen la capa sólida externa de la Tierra (Conv. o div.)

Principales Placas Tectónicas

7 placas principales: _

- Placa del Pacífico: ~ 70 millones de km², es la mayor placa oceánica;
- Placa Africana: 65 millones de km²
- Placa Sud Americana: 32 millones de km²
- Placa Euroasiática
- Placa Australiana
- Placa Antártica

7 placas de tamaño medio:

Placa de Nazca: 10 millones de km², disminuye 10 c/año por chocarse con la placa Sud Americana. El choque de estas dos placas originó la Cordillera de los Andes.

- Placa Caribeña

- Placa Filipina

- Placa Arábica

- Placa de Cocos

- Placa de Scotia

- Placa Juan de Fuca

Además de la existencia de placas más pequeñas.

Cómo se mueven las placas?

- La piedra angular sobre la que se sustenta la Teoría de la Tectónica de Placas, es la **Teoría de la expansión del suelo oceánico**. Según esta teoría, el fondo oceánico se expande a partir del eje o *Rift* de las Dorsales oceánicas. Esto indica que dos puntos situados a ambos lados de la Dorsal se separarán cada vez más conforme avanza el tiempo. Simultáneamente a la expansión del suelo oceánico y para rellenar el hueco dejado en el valle central debe emplazarse roca nueva.
- Las placas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 - 5 cm/año¹.

- **BORDES (LÍMITES DE PLACA)** que son responsables por fenómenos como: terremotos, expansión de los océanos, formación de volcanes y fosas oceánicas: Divergentes, Convergentes y de Falla transformante.

Limite Divergente o Constructivo: son las zonas donde se forma nueva corteza oceánica y en las cuales se separan las placas. El vacío que surge de esta separación está relleno con material de corteza que surge del magma. Se genera nueva litósfera oceánica (centros de expansión).

Ej: Dorsales Oceánicas (DORSAL MESOATLÁNTICA)

El magma se enfría gradualmente generando roca dura y produciendo nuevos fragmentos de fondo

Limite Convergente o Destructivo:

Cuando una placa oceánica (más densa) choca contra una continental (menos densa) la placa oceánica es empujada debajo, formando una zona de subducción. En la superficie, la modificación topográfica consiste en una fosa oceánica en el agua y un grupo de montañas en tierra.

Esto explica el hecho de que aunque continuamente se produzca formación de nueva litósfera en las dorsales oceánicas el tamaño del planeta no aumenta: su superficie total Permanece constante.

Las porciones más antiguas de la litosfera oceánica descienden al manto a lo largo de los bordes convergentes.

<https://www.youtube.com/watch?v=mztXG56ffTU>

La forma de interacción entre placas varía, dependiendo del tipo de corteza en sus límites y de su movimiento. De acuerdo a lo anterior, se generan los siguientes fenómenos:

-Separación o zonas de abducción: el material magmático sale y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica. Se forma un nuevo suelo en ambas direcciones, lo que provoca que las placas se alejen de las dorsales. **BORDES DIVERGENTES**

-Acercamiento o zonas de subducción: ocurre cuando una placa se hunde debajo de otra. La placa que se sumerge se transforma hasta fundirse en el interior de la Tierra. Son áreas de intensa actividad volcánica y sísmica. **BORDES CONVERGENTES**

-Desplazamientos laterales: se produce un movimiento relativo entre dos placas con rozamiento en la falla. Estas pueden situarse tanto en la litosfera oceánica como en la continental. Un ejemplo de este tipo es la falla de San Andrés, que separa la placa de Norteamérica de la del Pacífico. El roce que se produce entre las placas provoca actividad sísmica. **BORDES DE FALLA TRANSFORMANTE**

A. Borde divergente

B. Borde convergente

C. Borde transformante

Borde de falla transformante Dorsal Mesoatlántica

Convergencia Oceánica-Oceánica

Arcos de Islas Oceánicas

La corteza oceánica más antigua (más fría, más densa y alejada del punto de formación) presenta subducción.

Las Antillas Menores

Falla de San Andrés

Terremotos, o tremlores de terra, ocorrem quando hay un movimiento mayor de esas placas, que pueden deslizar-se lateralmente, para arriba o abajo una de otra. Cuando las placas se chocan pueden crear tambien dobleces y fallas que dan origen a grandes cadenas de montañas como los Andes y Alpes.

Otro fenómeno causado por movimiento de placas son los **volcanes**/

'HOT SPOTS'

Cadena de Islas de Hawaii

Terremotos, volcanes y Tsunamis (Formación)

01 / 5:05

https://www.youtube.com/watch?v=QtR-PFG7Smg&list=PLMeDQjA4EhUKVJL7TQnKAhOOryNaHVmoa&feature=player_detailpage

Principais HOT-SPOTS do mundo

Volcán Krakatoa entró en erupción el 10 de abril del 2020

APERTURA DEL ATLÁNTICO SUR

Eonothem / Eon Erathem / Era System / Period		Series / Epoch	Stage / Age	GSSP	numerical age (Ma)	
Phanerozoic	Mesozoic	Jurassic	Upper	Tithonian		152.1 ± 0.9
				Kimmeridgian		157.3 ± 1.0
			Middle	Oxfordian		163.5 ± 1.0
				Callovian		166.1 ± 1.2
				Bathonian		168.3 ± 1.3
			Bajocian		170.3 ± 1.4	
			Aalenian		174.1 ± 1.0	
		Lower	Toarcian		182.7 ± 0.7	
			Pliensbachian		190.8 ± 1.0	
			Sinemurian		199.3 ± 0.3	
		Hettangian		201.3 ± 0.2		
		Rhaetian		~ 208.5		
	Triassic	Upper	Norian		~ 227	
			Carnian		~ 237	
		Middle	Ladinian		~ 242	
			Anisian		247.2	
		Lower	Olenekian		251.2	
	Induan			251.902 ± 0.024		
	Permian	Lopingian	Wuchiapingian		254.14 ± 0.07	
			Changhsingian		259.1 ± 0.5	
Guadalupian		Capitanian		265.1 ± 0.4		
		Wordian		268.8 ± 0.5		
		Roadian		272.95 ± 0.11		
Cisuralian		Kungurian		283.5 ± 0.6		
		Artinskian		290.1 ± 0.26		
Sakmarian		Sakmarian		293.52 ± 0.17		
		Asselian		298.9 ± 0.15		
Carboniferous		Upper	Gzhelian		303.7 ± 0.1	
	Kasimovian			307.0 ± 0.1		
	Middle	Moscovian		315.2 ± 0.2		
		Bashkirian		323.2 ± 0.4		
	Lower	Serpukhovian		330.9 ± 0.2		
		Visean		346.7 ± 0.4		
	Mississippian	Tournaisian		358.9 ± 0.4		

Fragmentación del super
Continente Pangea 250-200 Ma

Supercontinente Pangea (540 a 200 Ma)

Eonothem / Eon		Erathem / Era		Series / Epoch	Stage / Age	GSSP	numerical age (Ma)		
Phanerozoic	Mesozoic	Jurassic	Upper	Tithonian		152.1 ± 0.9			
				Kimmeridgian		157.3 ± 1.0			
			Middle	Oxfordian		163.5 ± 1.0			
				Callovian		166.1 ± 1.2			
				Bathonian		168.3 ± 1.3			
				Bajocian		170.3 ± 1.4			
				Aalenian		174.1 ± 1.0			
			Toarcian		182.7 ± 0.7				
			Lower	Pliensbachian		190.8 ± 1.0			
				Sinemurian		199.3 ± 0.3			
	Triassic			Hettangian		201.3 ± 0.2			
				Rhaetian		~ 208.5			
				Upper	Norian		~ 227		
					Carnian		~ 237		
				Middle	Ladinian		~ 242		
					Anisian		247.2		
				Lower	Olenekian		251.2		
					Induan		251.902 ± 0.024		
				Paleozoic	Permian		Changhsingian		254.14 ± 0.07
							Lopingian		259.1 ± 0.5
Guadalupian	Wuchiapingian		265.1 ± 0.4						
	Wordian		268.8 ± 0.5						
	Roadian		272.95 ± 0.11						
Cisuralian	Kungurian		283.5 ± 0.6						
	Artinskian		290.1 ± 0.26						
	Sakmarian		293.52 ± 0.17						
	Asselian		298.9 ± 0.15						
Carboniferous	Pennsylvanian		Gzhelian					303.7 ± 0.1	
			Kasimovian		307.0 ± 0.1				
			Middle	Moscovian		315.2 ± 0.2			
				Bashkirian		323.2 ± 0.4			
	Mississippian		Upper	Serpukhovian		330.9 ± 0.2			
			Middle	Visean		346.7 ± 0.4			
			Lower	Tournaisian		358.9 ± 0.4			

Inicio de fragmentación del supercontinente Gondwana 180-160Ma

Fragmentación del último Continente Pangea 250-200 Ma

Gondwana – Laurasia (200 a 160 Ma)

Supercontinente Pangea (540 a 200 Ma)

Primer pulso de apertura (120-115 Ma)

Aptiano

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años
C	CUATERNARIO	Holoceno		Ioniense	0,011
		Pleistoceno		Calabriense	1,8
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasiense	5,3
			Inferior	Piacenziense Zancleense	
		Mioceno	Superior	Messiniense	23
			Medio	Tortonense Serravallense Langhiense	
			Inferior	Burdigaliense	
				Aquitaniense	
O	PALEÓGENO	Oligoceno	Superior	Chattense	33,9
			Inferior	Rupeliense	
		Eoceno	Superior	Frabonense	55,8
			Medio	Bartonense	
			Inferior	Luteciense	
				Ypresiense	
Paleoceno	Superior	Thanetiense	65,5		
	Inferior	Selandiense Dardiense			
M	CRETÁCICO	Senonense	Maastrichtense	99,6	
			Campaniense		
			Santonense		
			Comaciense		
			Turonense		
		Superior	Cenomaniense		
			Inferior	Albiense	
		Aptiense			
		Barremiense			
		Neocomiense	Hauteriviense	145,5	
Valanginiense Bernasiense					
O	JURÁSICO	Superior (Malm)	Tithoniense	161,2	
			Kimmeringiense		
			Oxfordiense		
		Medio (Dooger)	Calloviense	175,6	
			Bathonense		
			Ejociense Aalenense		
I	C	Inferior (Lias)	Toarciense	199,6	
			Phiensbachiense		
			Sinemuriense		
			Hettangiense		
			228		
O	TRIÁSICO	Superior	Keuper	228	
		Medio	Muschelkalk	245	
		Inferior	Buntsandstein	251	
PALEOZOICO	PERMICO			542	
	CARBONIFERO				
	DEVONICO				
	SILURICO				
	ORDOVICICO				
CAMBRICO					
PRECAMBRICO

Segundo pulso de apertura (110 – 100 Ma)

Albiano – Albiano -Cenomaniano

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años		
C	CUATERNARIO	Holoceno			0,011		
		Pleistoceno		Ioniense Calabriense	1,8		
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasiense Piacenziense	5,3		
			Inferior	Zanclense			
	Mioceno	Superior		Messiniense Tortonense	23		
			Medio	Serravallense Langhiense			
			Inferior	Burdigaliense Aquitaniense			
		Paleoceno	Superior		Chattense Rupeliense	33,9	
				Medio	Prabonense		
			Inferior	Bartonense Luteciense	55,8		
	Paleoceno	Superior		Thanetiense Selandense	65,5		
			Inferior	Daniense			
M	CRETÁCICO	Senoniense		Maastrichtense Campaniense Santonense Coniacense	99		
			Superior	Turomense Cenomanense			
		Inferior		Albiense Aptiense Barremiense	145,5		
			Neocomiense	Hauteriviense Valanginiense Berniense			
		O	JURÁSICO	Superior (Malm)		Tithoniense Kimmeridgiense Oxfordiense	161,2
					Medio (Dogger)	Calloviense Bathonense Bajociense Aalenense	
				Inferior (Lias)		Toarciense Pitensbachense Sinemuriense Hettangiense	175,6
		O	TRIÁSICO	Superior	Keuper	Rhaetense Nomenense	199,6
Medio	Muschelkalk			Ladiniense Anisiense	245		
Inferior	Buntsandstein			Olenekense Indiense	251		
PALEOZOICO	PERMICO						
	CARBONIFERO						
	DEVÓNICO						
	SILURIANO						
	ORDOVICIANO						
	CAMBRICO				542		
PRECAMBRICO

Tercer pulso de apertura (90 – 80 Ma)

Turoniano - Campaniano

Era	Periodo	Época	Edad	Millones de años	
C	CUATERNARIO	Holoceno	Ioniense	0,011	
		Pleistoceno	Calabriense	1,8	
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasienne	5,3
			Inferior	Piacenziense	
		Mioceno	Superior	Zancleense	23
			Superior	Messiniense	
			Medio	Tortonienne	
			Inferior	Serravallienne	
O	PALEÓGENO	Oligoceno	Superior	Burdigaliense	33,9
			Inferior	Aquitaniense	
		Eoceno	Superior	Chattienne	55,8
			Superior	Rupeliense	
			Medio	Prabonense	
			Inferior	Bartonense	
O	Paleoceno	Superior	Luteciense	65,5	
		Inferior	Ypresiense		
M	CRETÁCICO	Senoniense	Maastrichtiense	99,6	
			Campaniense		
		Superior	Santoniense	145,5	
			Coniaciense		
		Inferior	Turonienne	161,2	
			Cenomaniense		
O	JURÁSICO	Superior (Malm)	Albiense	175,6	
			Aptiense		
		Medio (Dooger)	Barremiense	199,6	
			Hauteriviense		
		Inferior (Lias)	Valanginiense	228	
			Bernasiense		
O	TRIÁSICO	Superior	Keuper	245	
		Medio	Muschelkalk		
		Inferior	Buntsandstein		
PALEOZOICO	PERMICO		Indiense	542	
	CARBONIFERO				
	DEVONICO				
	SILURICO				
	ORDOVICICO				
	CAMBRICO				
PRECAMBRICO

(75-70) Ma Maastrichtiense

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años				
C	CUATERNARIO	Holoceno			0,011				
		Pleistoceno		Ioniense Calabriense Gelasienne	1,8				
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Piacenziense	5,3				
			Inferior	Zanclense					
		Mioceno	Superior	Messiniense Tortonense Sarravaliense	23				
			Medio	Langhiense					
			Inferior	Burdigalense Aquitaniense					
			Oligoceno	Superior		Chattense	33,9		
				Inferior		Rupelense			
			I	EÓCENO		Superior	Prabonense	55,8	
		Bartonense							
		Medio			Luteciense				
Inferior	Ypresiense								
O	PALEÓCENO	Superior	Thanetiense	65,5					
		Inferior	Selandiense Daniese						
M	CRETÁCICO	Senoniense	Maastrichtiense	99,6					
			Campaniense Santoniense Coniaciense						
		Superior	Turonense Cenomaniense						
			Inferior		Albiense Aptiense Baremiense				
		Neocomiense			Hautiviense Valanginiense Berniense				
			J		JURÁSICO	Superior (Malm)	Tithoniense Kimmeridgiense Oxfordiense	145,5	
		Medio (Dogger)					Calloviense Bathoniense Bajociense Aalenense		
						Inferior (Lias)	Toarciense Phenobachiense Sinemuriense Hettangiense		
		TRIÁSICO					Superior		Keuper
						Medio	Muschelkalk		
Inferior	Buntsandstein								
PALEOZOICO	PERMICO		Rhaetiense Nonsense	228					
	CARBONIFERO		Ladmiense						
	DEVONICO		Artisiense						
	SILURICO		Olenekiense						
	ORDOVICICO		Induense						
	CAMBRICO								
PRECAMBRICO					542

(60 -50 Ma) Paleoceno – Eoceno Inferior

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años	
C	CUATERNARIO	Holoceno			0,011	
		Pleistoceno		Ioniense Calabriense	1,8	
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasienne Piacenziense Zanclienne	5,3	
			Inferior	Messiniense Tortonienne Serravallienne		
		Mioceno	Superior	Langhiense Burdigalense Aquitaniense	23	
			Medio	Chattienne		
			Inferior	Rupeliense		
		O	PALEÓGENO	Oligoceno	Superior	Praboniense
Inferior	Bartonense Luteciense					
Eoceno	Superior			Ypresiense	55,8	
	Inferior			Thanetiense Selandiense Daniese		
M	CRETÁCICO			Senoniense	Maastrichtiense Campaniense Santonense Coniaciense	65,5
					Superior	
		Inferior	Albiense Aptiense Bariemense	99,6		
			Neocomiense		Hautiviense Valanginiense Berniense	
		O	JURÁSICO	Superior (Malm)	Tithoniense Kimmeridgiense Oxfordiense	145,5
					Medio (Dogger)	
Inferior (Lias)	Toarciense Phenobachiense Sinemuriense Hettangiense			161,2		
	Triásico				Rhaetiense Nemense Ladmiense Ariensiense Olenekiense Indusiense	
O	TRIÁSICO			Superior	Keuper	175,6
				Medio	Muschelkalk	199,6
O	TRIÁSICO	Inferior	Buntsandstein	228		
				245		
PALEOZOICO	PERMICO			251		
	CARBONIFERO					
	DEVONICO					
	SILURICO					
	ORDOVICICO					
	CAMBRICO					
	PRECAMBRICO				542

(40 – 30 Ma) Eoceno superior - Oligoceno

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años
C	CUATERNARIO	Holoceno		Ioniense	0,011
		Pleistoceno		Calabrense	1,8
E	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasienense	5,3
			Inferior	Piacenziense	
O	MIOCENO		Superior	Zancleziense	23
			Medio	Messiniense	
O	PALEÓGENO	Oligoceno	Superior	Tortonienense	55,8
			Inferior	Serravallienense	
C	EOCENO		Superior	Langhiense	65,5
			Medio	Burdigaliense	
O	PALEOCENO		Superior	Aquitaniense	99,6
			Inferior	Chattienense	
M	CRETÁCICO		Superior	Rupeliense	145,5
			Inferior	Senoniense	
O	JURÁSICO		Superior (Malm)	Maastrichtiense	161,2
			Medio (Dooger)	Campaniense	
C	TRIÁSICO		Superior	Santonense	175,6
			Medio	Coniaciense	
O	PERMICO		Superior	Turonense	199,6
			Medio	Cenomaniense	
PALEOZOICO	DEVÓNICO		Superior	Albiense	228
			Medio	Aptienense	
O	SILURICO		Superior	Barremiense	245
			Medio	Hautviviense	
O	ORDOVÍCICO		Superior	Valanginiense	251
			Medio	Berniense	
O	CAMBRICO		Superior	Tithomense	542
			Medio	Kimmeridgiense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Oxfordiense	
			Medio	Calloviense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Bathonense	
			Medio	Ejocienense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Aalenense	
			Medio	Toarciense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Pfienzbachiense	
			Medio	Sinemuriense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Hettangiense	
			Medio	Rhaetiense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Nonsense	
			Medio	Ladiniense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Anisienense	
			Medio	Olenekiense	
O	PRECAMBRICO		Superior	Induense	
			Medio

(20 – 10 Ma) Mioceno Medio

Era	Periodo	Época		Edad	Millones de años
CENozoico	CUATERNARIO	Holoceno		Ioniense	0,011
		Pleistoceno		Calabriense	
	NEÓGENO	Plioceno	Superior	Gelasiense	5,3
			Inferior	Piacenziense	
		Mioceno	Superior	Zanclensiense	23
			Medio	Messiniense	
				Tortonense	
			Inferior	Serravallense	
	PALEOCENO	Oligoceno	Superior	Langhiense	33,9
			Inferior	Burdigaliense	
		Eoceno	Superior	Aqutaniense	55,8
			Superior	Chattense	
			Inferior	Rupeliense	
		Paleoceno	Superior	Frabonense	65,5
Bartonense					
Inferior			Luteciense		
MESOZOICO	CRETÁCICO	Superior	Thantense	99,6	
			Senoniense		
			Campaniense		
		Inferior	Santonense		
			Turonense		
			Cenomaniense		
	JURÁSICO	Superior (Malm)	Albiense	145,5	
			Oxfordiense		
		Medio (Dooger)	Kimmendgiense		
	TRIÁSICO	Superior	Calloviense	161,2	
			Doogeriense		
		Inferior (Lias)	Bajociense		
			Aalenense		
	PERMIANO	Superior	Keuper	175,6	
Medio		Muschelkalk	199,6		
Inferior		Rhaetiense	228		
		Buntsandstein	Nemense		
PALEOZOICO	Permiano		245		
	Carbonífero		251		
	Devónico				
	Siluriano				
	Ordoviciano				
	Cambrico				
PRECAMBRICO					542

Cuencas Oceánicas

- Las cuencas oceánicas son amplias depresiones geológicas que quedan por debajo del nivel del mar (19 cuencas).
- Alcanzan 6000 m de profundidad
- Pueden activamente cambiar de tamaño o estar inactivas.

Oc. Atlántico (activa)

Golfo de México (inactiva)

- Pueden describirse 7 clases de accidentes topográficos en las cuencas:

- Cordilleras del medio del océano (Dorsales Oceánicas),
- Fosas del océano profundo,
- Arcos Insulares,
- Atolones,
- Montañas marinas,
- Guyots,
- Piso Abisal

Dorsales Oceánicas

- Forman un cinturón de más de 60.000 km de long. que rodean el mundo.
- Anchura entre 800 y 4000 km.
- Altura media 2000 a 3000 m.

DORSAL MESOATLÁNTICA: corresponde al segmento más estudiado de la dorsal.

- Cordillera volcánica que bisecta el Oc. Atlántico (15.000 km).
- Rompe la superficie oceánica en varios lugares dando lugar a 7 islas: Islandia, Azores, San Pedro y San Pablo, Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha y Bouvet.
- Presenta un profundo valle “rift” en su cresta por dde sale magma continuamente se ensancha 3cm/año. Debido a esto las rocas son más jóvenes en el centro de la dorsal. A lo largo de millones de años el fondo del océano va creciendo y se expande, los continentes se alejan entre si.

Atolón

- Es una isla coralina oceánica.
- Generalmente con forma de anillo más o menos circular o conjunto de varias islas pequeñas.
- Se forman cuando un arrecife de coral crece alrededor de una isla volcánica a medida que la isla se va hundiendo en el océano.

Atolón de las Rocas
(Rio Grande do Norte, Brasil)

Figure 1. Study area: Atol das Rocas, Brazil.

Formación de un Atolón

Etapas del desarrollo:

1) *Fringing reefs* (Arrecifes perisféricos)

Cuando encuentran condiciones adecuadas de T, sal y turb. No se desarrollan mucho.

2) *Barrier reef* (barrera coralina)

Lineales o circulares con laguna bien desarrollada.

El sistema más desarrollado: *Australia's Greet Barrier Reef*

3) *Atoll* (Atolón)

<https://www.youtube.com/watch?v=rSzYHO1EU24>

Australia's Great Barrier Reef

Más de 3000 corales individuales (cientos de especies de corales)

Miles de organismos asociados

150 km de ancho y una extensión de 2000 km

Nueva teoría sobre formación de ATOLÓN

Sugiere que los ciclos glaciares que causaron la fluctuación del nivel del mar, llevaron a episodios de exposición del arrecife y a disolución (cuando el nivel del mar estaba bajo – períodos glaciares). Ésto alternaría con la sumersión del arrecife y su crecimiento en momentos de nivel alto del mar (períodos interglaciales).

Estos ciclos alternados serían los responsables de la formación de los Atolones.

Monte Submarino

- Es una montaña que se eleva del fondo del océano pero que no sobresale nivel del mar (1000 m);
- Volcanes extintos (formados de rocas volcánicas: sustrato mas pesado que lecho de sedimentos que los rodea);
- Fauna con alto grado de endemismo
- Incrustaciones polimetálicas (cobalto y platino);
- *Hot spots* de diversidad.

*Ferromanganese crusts on a seamount
(CoRMCH, Auki)*

*Section of a Ferromanganese crust
(CoRMCH, Auki)*

Guyot (Monte submarino)

- Formaciones volcánicas que en un pasado lejano sobresalían del nivel del mar como pequeñas islas;
- Su cima sufrió erosión y luego sufrió subsidencia provocando su inmersión (900 y 1800 m de prof.);
- Raramente están aislados forman alineaciones de hasta centenares de ellos

Arcos Insulares

- Un *arco insular* es una clase de archipiélago formado por la tectónica de placas.
- Es una zona de subducción, el borde de una placa se desliza por debajo de la otra, oprimiéndola.
- Cuando un continente se encuentra próximo a una zona de subducción surgen a lo largo de su línea costera volcanes que actúan como válvulas naturales para liberar presión del interior de la Tierra.

Pequeñas Antillas